



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: GSM 0477/65 83 17 - 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

Fougères (semi) péersistentes.

Les fougères à frondaison persistante résistent en général mieux à la sécheresse que les variétés caduques.

Elles supportent mieux aussi la pleine ombre car elles compensent le manque de lumière de l'été, dû au couvert végétal, en hiver. Très attractives par le feuillage vert en hiver, elles occupent une place importante dans les aménagements, aussi bien comme plantes couvre-sols qu'en groupes ou en isolées.

Il faudra supprimer les frondes séchées ou abîmées après la frondaison importante du printemps et les planter en situation abritée des vents d'est en hiver car ils sont desséchant.

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol.

☼ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire.

I = Indigène.

	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
Asplenium ceterach Indigène	☀ ◐	P	10	10	T	☼	Fougère de situation chaude, se plaît en murets ou sur rocher. Les pinnules s'enroulent en cas de soleil, la face écailleuse et argentée ainsi exposée forme une protection. Reviviscente.
Asplenium trichomanes Indigène	☀ ●	P	15	20	T	☼	Croissance dynamique, conquiert les moindres fissures de rochers. Une fois installée, elle se plaque sur le muret comme une araignée.
Asplenium trichomanes 'Incisum'	☀ ●	P	15	20	T	☼	Comme l'espèce, mais les pinnules sont finement incisées.
Blechnum penna-marina	☀ ●	P	20	50	F à M	☹	Épais rhizomes traçants denses. Frondes coriaces et brillantes, dressées, d'abord vert rougeâtre, ensuite vert foncé.
Blechnum penne-marina 'Alpina'	☀ ●	P	10-15	30	F	☹	Fougères rampantes formant des colonies basses. Les frondes fertiles émergent dressées à la verticale d'un éclat violacé.
Blechnum spicant Indigène	◐ ●	P	20-60	50	F à M	☹	Fougère à dimorphisme foliaire : frondes fertiles érigées en arête de poisson, un peu violacées. De nombreuses frondes stériles, coriaces et épaisses sont disposées en rosette étalée et persistante.
Cyrtidium fortunei	◐ ●	P	50	40	H		Appelée fougère houx, elle présente une silhouette dressée. Les frondes, vert foncé mat, divisées une fois en pinnules allongées et étroites. Situation abritée et drainée. Rusticité -15 C°.
Cyrtidium fortunei 'Clivicola'	◐ ●	P	40	50	H		Comme l'espèce, port étalé ou tombant. Pour situations abritées, drainées ou en pot. Rusticité -15 C°.
Dryopteris affinis 'Pinderii'	◐ ●	P	80-120	50	T		Fougère ayant une silhouette érigée, dressée, aux frondes étroites et gaufrées. En certains lieux, on peut l'utiliser comme plante de structure. Puissante, sans exigence.
Dryopteris bushiana	◐ ●	P	60	60	T		Fronde brillante vert soutenu, divisée une fois. Forme des bouquets ouverts, persistants. Accepte la sécheresse.
Dryopteris carthusiana Indigène	◐	SP	60-80	50	T à M		Long pétiole portant des frondes largement triangulaires, vert clair presque acidulé, deux à trois fois divisé. Les pinnules sont dentées. Couronne peu fournie sur un épais rhizome rampant au-dessus du sol. Apprécie l'acidité.
Dryopteris clintoniana	◐ ●	SP	50-70	50	F à M		Frondes aux découpes arrondies, aux pinnules larges, d'un vert pâle mat. Souche étalée et drageonnante.
Dryopteris cycadina	◐ ●	P	70-80	50	T		Fougère à la silhouette aérée. Frondes larges. Déploiement des crosses couvertes d'écailles noires et laissant une pointe tombante. Sol plutôt acide.



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - E-mail:

info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol.

⚡ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire.

I = Indigène.

	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
Dryopteris dilatata Indigène	◐ ●	SP	80-120	50	T		Fougère à couronne évasée de frondes luisantes vert sombre parsemées de glandes jaunâtres. La couleur des jeunes pousses contraste avec les frondes âgées. Apprécie les lieux frais
Dryopteris erythrosora	◐ ●	P	60	40	T		Souche dressée et aérée. Portées sur un long pétiole, les frondes brillantes, largement triangulaires sont d'abords rose rougeâtre, vert ensuite. Développement coloré toute la saison.
Dryopteris erythrosora 'Prolifica'	◐ ●	P	40	50	T		Plus basse que l'espèce. Souche à étalement court. Les frondes légèrement gaufrées aux pinnules rétrécies. Bien teintées de rose rougeâtre dans leur jeunesse.
Dryopteris sieboldii	◐	P	40	60	T	☹	Les frondes à découpe particulière s'allongeant de deux pinnules chaque année. Silhouette lâche, étalée. Pour situation abritée. Rusticité : -15 C°.
Dryopteris wallichiana	◐ ●	SP	100-120	60	F		Fougère impressionnante par son élégance et son envergure. Le rachis jusqu'à la nervure est protégé d'écailles noires d'un effet marquant lors du déroulement des crosses. Se pique d'or et cuivre en hiver.
Phyllitis scolopendrium Indigène	◐ ●	P	40-60	30	F	⚡	Frondes entières, rubanées, ressemblant à une longue langue et disposées en rosette ou pendante si la plante est accrochée dans les fissures de rochers.
Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia'	◐ ●	P	30-60	30	F	⚡	Comme l'espèce, frondes plus étroites et à bords finement crispés..
Phyllitis scolopendrium 'Cristata'	◐ ●	P	20-40	30	F	⚡	Comme l'espèce, aux frondes plus courtes, ondulées et divisées sur les extrémités.
Phyllitis scolopendrium 'Furcatum'	◐ ●	P	30	20	F	⚡	Comme l'espèce, frondes aux extrémités corybiformes.
Phyllitis scolopendrium 'Undulata'	◐ ●	P	50	30	F	⚡	Comme l'espèce, frondes au limbe ondulé.
Polypodium vulgare Indigène	☀ ●	P	30-40	20	T		Plantes sculpturales pour vieux murs, talus, escaliers, se contente de peu de terre. Rhizomes charnus. Frondes coriaces, profondément lobées, vert foncé. Au soleil, vieillit à l'arrosage jusqu'à son installation.
Polypodium vulgare 'Bifido multifido'	☀ ●	P	30-40	20	T		Comme l'espèce, variété aux extrémités épatées et multibifurquées.
Polypodium vulgare 'Cornubiense'	☀ ●	P	30	20	T		Comme l'espèce, frondes fortement divisées, aux pennes se chevauchant, donnant un aspect dense.
Polypodium interjectum Indigène	◐ ●	P	20-40	20	T		Fougère traçante formant avec le temps de grandes colonies sur des vieux murs, talus ombragés, au bord d'escaliers ou très belle en pot.
Polystichum acrostichoïdes	◐ ●	P	50	30	T		Fougère en rosette étalée, aux frondes coriaces d'un vert foncé et aux découpes rondes. Les frondes fertiles, plus dressées s'effilant brusquement sur les sommets. Accepte les situations ombreuses mais demande un sol drainé.
Polystichum aculeatum Indigène	◐ ●	P	50	80	T		Frondes persistantes vert sombre. Silhouette en rosette très ouverte, étalée, restant parfaite jusqu'au printemps.
Polystichum andersonii	◐ ●	SP	60	40	T		Cône érigé de frondes larges. Les crosses sont très blanches et laineuses. Produit à l'extrémité des frondes 1 bulbille.
Polystichum braunii	◐	SP	50	40	T F		Fougère déployant des crosses particulièrement blanches, d'aspect floconneux, laissant un léger duvet sur les frondes. Sur sols frais plutôt acide.
Polystichum munitum	◐ ●	P	60	80	T		Touffe vigoureuse à rhizome court pouvant devenir large. Frondes une fois découpées à lobes étroit et acuminé, vert foncé, parcheminée et coriace. Apprécie des sols frais à sec toujours bien drainés.



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - E-mail:

info@fougeres.be - www.fougeres.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol.

⚡ = craint l'acidité ; ⚡ = craint le calcaire.

I = Indigène.

	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
Polystichum polyblepharum	◐ ●	P	60	80	T		Fougère aux frondes persistante d'une vert lustré, couverte de poils doré surtout au déploiement. Les frondes poussent en couronne très arquées vers l'extérieur.
Polystichum rigens	◐ ●	P	30	40	T		Fougère particulière par ses frondes brillantes, coriaces et piquantes. Formant une silhouette très ouverte ; sur sol plutôt acide. Rusticité -15 C°.
Polystichum setiferum Indigène	◐ ●	P	80	60	T		Frondes lancéolées, vert foncé, portant des dents soyeuses. Silhouette érigée, parfois plus ouverte, les crosses se déploient en exposant de nombreuses écailles argentées. Facile et vigoureuse.
Polystichum setiferum 'Bevis'	◐ ●	P	80	100	T		Comme l'espèce mais les frondes, lisses, montrent des pinnules plus allongées et espacées, les segments s'incurvent gracieusement vers l'extrémité. Touffe de taille imposante. Variété stérile, les frondes sont utilisées en bouquetterie.
Polystichum setiferum 'Congestum'	◐ ●	P	20	20	T		Comme l'espèce, mais frondes denses et plus ramassées, aux pinnules se chevauchant. Crosses aux écailles blanches.
Polystichum setiferum 'Dalhem'	◐ ●	P	60-70	60	T		Comme l'espèce, mais plus ouverte et gracieuse, dense et vigoureuse, frondaison cotonneuse. Contraste des jeunes frondes vert tendre sur les frondes plus âgées.
Polystichum setiferum 'Divisilobum'	◐ ●	P	50	50	T		Comme l'espèce, mais plus petite, fine découpe, présence de bourgeons adventices sur le pétiole, donnant naissance à des plantules.
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	◐ ●	P	40	80	T		Comme l'espèce, mais frondes irrégulières parfois très longue, très finement découpées. Les écailles rousses du pétiole marquent la fronde jusqu'à sa pointe. Silhouette étalée. Reste belle durant tout l'hiver.
Polystichum setiferum 'Plumosum'	◐ ●	P	80	60	T		Comme l'espèce, mais silhouette érigée parfois plus ouverte, les frondes sont finement découpées et plumeuses, légères.
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	◐ ●	P	50	50	T		Comme l'espèce, mais plus petite, forme de larges coussins moussus avec ses frondes à pinnules finement divisées, très denses et se chevauchant.
Polystichum setiferum 'Proliferum'	◐ ●	P	50	50	T		Comme l'espèce, silhouette étalée, frondes plus finement découpées, formation de bourgeons adventices le long du pétiole des plantes adultes.
Polystichum setiferum 'Wollastonii'	◐	P	60-70	50	T		Comme l'espèce, mais silhouette plus ramassée, frondes plus fines.
Polystichum tsus-sinense	◐	P	30	30	T		Silhouette érigée. Les frondes vert sombre, longuement effilées et coriaces, sont marquées par un pétiole noir jusqu'à la pointe.. Seulement pour une situation abritée. Rusticité -15 C°.