



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vault, 2 - B-5646 Stave - België

GSM 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougeres.be - www.fougeres.be - www.varens.be

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.

W = wintergroen ; HW = half wintergroen.

K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.

≠ = géén zure bodem; ≠ = géén kalkrijke bodem.

I = inheems.

	Stand plaats	Blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Adiantum pedatum	◐ ●		50	40	V		Fijne blaadjes in hoefijzervorm; heeft korte wortelstokken en vormt op termijn grote groepen.
Adiantum pedatum 'japonicum'	◐ ●		40	30	V		Zoals de soort maar het jonge blad loopt paars uit en kleurt van paars naar groen.
Athyrium filix-femina 'Frizeliae' (wenteltrapvaren)	☀ ◐ ●		30	30	A		Aparte smalbladige soort waarvan de bladeren herleid zijn tot halve maanvormige bladeren.
Athyrium filix-femina 'Minutissimum'	☀ ◐ ●		30	30	A		Dwergvorm met compacte blaadjes.
Athyrium filix-femina 'Victoriae'	☀ ◐ ●		50	40	A		Bijzondere soort met smalle bladeren en regelmatig over elkaar gekruiste blaadjes in V-vorm.
Athyrium filix-femina 'Vernoniae'	☀ ◐ ●		40	30	A		Een fijn geveerde varen met bleekgroen, bijna doorschijnend blad.
Athyrium niponicum 'Pictum' (Japanse regenboogvaren)	◐ ●		40	40	V		De kleurrijkste onder de varens, variërend van licht, donker- en geelgroene naar zilvergroeie exemplaren. De bodem moet voldoende vochtig maar goed gedraineerd zijn.
Athyrium niponicum 'Silver Falls'	◐ ●		40	40	V		Meer 'zilvergrijs' dan de soort.
Blechnum spicant (dubbelloof) Inheems	◐ ●	W	20-60	50	K tot M	≠	Inheemse, zeldzame varen voor zeer zuur en vochtig milieu.
Cheilanthes lanosa	☀ ◐	HW	20-30	30	D		Kleine zilvergrijze rotsvaren. Zeer beschutte standplaats.
Cyrtionium fortunei	◐ ●	W	50	40	V		Enkelgeveerde, mat blauwgroene bladeren, meer opgerichte groeiwijze.
Cyrtionium fortunei 'Clivicola'	◐ ●	W	40	50	V		Zoals de soort, maar grover en iets overhangend. Grotere groei-kracht en frisgroen.
Cystopteris bulbifera (Broedbolblaasvaren)	◐ ●		40-50		K		Draagt op de achterkant van de bladeren vele broedbolletjes die eens geworteld, nieuwe plantjes vormen. Ideale bodembekker.
Dryopteris affinis 'Crispa'	◐ ●	HW	40-50	40	A		Gedrongen en gekroesde vorm van de soort.
Dryopteris clintoniana	◐ ●	HW	50-70	50	K tot M		Heeft mat grijsgroene, tweemaal geveerde bladeren. Maakt vele uitlopers.
Dryopteris dilatata 'Crispa White Side'	◐ ●		40	20	A		Een mooie cultivar met fris lichtgroene, peterselie-achtige bladeren. Compacte groei.
Dryopteris dilatata 'Lepidota Crispa Cristata'	◐ ●		20	20	A		Een mooie cultivar met fris lichtgroene, peterselie-achtige bladeren. Compacte groei.
Dryopteris erythrosora 'Prolifica'	◐ ●	W	40	50	A		Kleiner dan de soort met lichtgewafelde bladeren. Loopt ook rozerood uit. Vormt broedbolletjes waaruit zich nieuwe plantjes ontwikkelen.
Dryopteris filix-mas 'Crispa'	☀ ●		40-50	50	A		Gedrongen en gekroesde vorm met gewafelde bladeren. Vormt na jaren dichte bosjes.
Dryopteris filix-mas 'Cristata'	☀ ●		50	50	A		Nog fijner gedeeld dan de Crispa met aan de uiteinden handvormig vertakte veertjes.
Dryopteris marginalis	◐ ●		40-50	30	V tot M		Varen met korte wortelstok en dubbelgeveerde, blauwgroene bladeren.
Dryopteris sieboldii	◐	W	40	60	A	≠	Aparte, decoratieve varen met diep gedeelde, tongvormige en leerachtige bladeren. Voor beschutte plek. Wintergroen.
Osmunda cinnamomea 'Foekyensis'	◐		50	30	K tot M		Kleinere variëteit van de soort met een mooi rode bladsteel.
Phegopteris connectilis (smalle beukvaren)	◐ ●		20-40	50	K		Een zeldzame inheemse soort uit vochtige loofbossen, langs greppels en beken. Behaarde bladeren op lange roze bladsteel. Onderste paar veertjes niet vergroeid met hoofdnerf, maar vrij



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vault, 2 - B-5646 Stave - België
 Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 E-mail: info@fougeres.be - www.fougeres.be - www.varens.be

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.
 K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.
 ≍ = géén zure bodem; ≋ = géén kalkrijke bodem.
 I = inheems.

	Stand plaats	blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Inheems							naar beneden gebogen.
Phegopteris Decursive-Pinnata	◐ ●		20-40	50	K		Oosterse varens met smalle, lancetvormige bladeren met elegant omgebogen veertjes.
Phyllitis scolopendrium Inheems	◐ ●	W	40-60	30	K	≍	De inheemse tongvaren groeit in bossen met kalkrijke, rotsachtige bodem, op vochtige muren en in de duinen. Bladeren tongvormig, bladsteel kort met haarachtige schubben.
Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia'	◐ ●	W	30-60	30	K	≍	Variëteit met smalle, gekartelde bladeren.
Phyllitis scolopendrium 'Cristata'	◐ ●	W	20-40	30	K	≍	Variëteit met kortere bladeren waarvan uiteinden sterk kamvormig verbreed en ingesneden zijn.
Phyllitis scolopendrium 'Furcatum'	◐ ●	W	30	20	F	▲	Zoals de Cristata, maar de bladeren zijn ook onderaan vertakt zoals een 'vork'.
Phyllitis scolopendrium 'Undulata'	◐ ●	W	50	30	F	▲	Variëteit met licht gegolfde bladranden.
Polypodium vulgare (eikvaren) Inheems	☀ ●	W	30-40	20	A		De inheemse eikvaren is een zeer sterke wintergroene varen. Ideaal als bodembedekker op oude boomstronken, oude muren en trappen, op rotsige hellingen. Houdt van zandige bodem.
Polypodium vulgare 'Bifido multifido'	☀ ●	W	30-40	20	A		Cultivar met vertakte bladstippen aan de uiteinden.
Polypodium vulgare 'Cornubiense'	☀ ●	W	30	20	A		Cultivar met zeer fijn gedeelde bladeren.
Polypodium interjectum (brede eikvaren) Inheems	◐ ●	W	20-40	20	A		Heeft bredere en meer toegespitste bladeren ; de veertjes zijn ook spitzer en gezaagd. Onderste paren vaak langer zodat de bladeren driehoekig zijn. Kalkrijke bodem.
Polystichum acrostichoïdes (kerstvaren)	◐ ●	W	50	30	A		Een wintergroene Amerikaanse varen met glanzende, eenmaal geveerde bladeren. Steriele bladeren groeien min of meer horizontaal terwijl de fertiele bladeren meer rechtop groeien. Vraagt een goed gedraineerde bodem.
Polystichum aculeatum (harde naaldvaren) Inheems	◐ ●	W	50	80	A		De inheemse, vrij zeldzame, harde naaldvaren gedijt goed op stenige hellingen. De glanzende, leerachtige bladeren zijn tweemaal gedeeld en kunnen tot één meter lang worden. Blandranden zijn getand. Lage maar brede groeiwijze.
Polystichum braunii	◐	HW	50	40	AK		Loopt vroeg uit met zilverwitte schubben op de bladeren.
Polystichum rigens	◐ ●	W	30	40	A		Een varen met stijve donkergroene, matglanzende, enkelgeveerde bladeren op vrij lange bladstelen. Losse groeiwijze. Beschuutte standplaats.
Polystichum setiferum 'Divisilobum'	◐ ●	W	50	50	A		Een variëteit met drie- tot viermaal geveerde bladeren. De veertjes zijn smal, geoord en gesteeld. Heeft meestal een vlakke en brede groeiwijze. Produceert soms broedbolletjes op de bladsteel waaruit zich jonge plantjes ontwikkelen. Vele bruine schubben.
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	◐ ●	W	40	80	A		Een zeer mooie Duitse cultivar die opvalt door zijn omvang en zijn lange, twee- tot driemaal gedeelde bladeren. Vele bruine schubben sieren de bladsteel.
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	◐ ●	W	50	50	A		Een sierlijke varen met een lage en vlakke groeiwijze.
Polystichum setiferum 'Proliferum'	◐ ●	W	50	50	A		Een horizontaal groeiende varen met smalle, lange en fijn gedeelde bladeren die schuin afstaan. Produceert vele broedbolletjes langs de hoofdnerf van de volwassen plant. Wintergroen.
Polystichum tsus-sinense (smalle naaldvaren)	◐	W	30	30	A		Een kleine varen met dubbelgeveerde, donkergroene en driehoekige bladeren op een zwarte bladsteel. Beschuutte standplaats.



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België
 Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 E-mail: info@fougeres.be - www.fougeres.be - www.varens.be

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.
 K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.
 ⚡ = géén zure bodem; ⚡ = géén kalkrijke bodem.
 I = inheems.

	Stand plaats	blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Thelypteris decursive-pinnata	◐ ●		40	50	K		Het geheel van lange en korte bladeren is mat lichtgroen. De wortelstok kruipt langzaam en produceert verschillende scheuten. Op die manier ontstaan grote kolonies. Dit is een zeer vroege varen.
Thelypteris palustris (moerasvaren) Inheems	☀ ◐		30-80	100	M		De inheemse moerasvaren komt algemeen voor in moerassen en vochtige bossen. Heeft vrij lichtgroene, tweemaal geveerde bladeren en is fijn van structuur. De fertiele bladeren zijn dikker en langer dan de steriele bladeren en verschijnen in de vroege zomer. Heeft een kruipende wortelstok.
Woodsia obtusa	◐ ●		30	10	A		Een rotsvaren met 30 cm lange lancetvormige, lichtgroene bladeren op gele bladsteel. Opgaande groeiwijze.