



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België

GSM 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougeres.be - www.fougeres.be - www.varens.be

Winterharde en half-winterharde varens

Bladbehoudende varens verdragen over het algemeen beter de droogte dan bladverliezende variëteiten. Ze verdragen ook beter de volle schaduw, want ze compenseren het gebrek aan licht in de zomer, wanneer ze door gebladerte overdekt zijn, in de winter. Door hun groene bladeren zijn ze zeer mooi in de winter. Daardoor kunnen ze zeer goed worden gebruikt in aanplantingen, zowel als bodembedekkers als als losse planten.

Na de winter, wanneer de nieuwe bladeren te voorschijn komen, moeten de droge of beschadigde bladeren worden weggeknipt. Het is ook belangrijk ze beschut van de koude oostenwind te planten, want ze drogen gemakkelijk uit.

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw. W = wintergroen ; HW = half wintergroen. K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes. ≇ = géén zure bodem; ≆ = géén kalkrijke bodem. I = inheems.							
	Stand plaats	Blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Asplenium ceterach (schubvaren) Inheems	☀ ◐		10	10	A	≇	Inheemse soort in beschutte rotsspleten en op oude muren. Vooral op kalk. Past zich uitstekend aan op droge en zonnige plaatsen door zijn blaadjes op te rollen.
Asplenium trichomanes (steenbreekvaren) Inheems	☀ ●		15	20	A	≇	Inheemse, algemeen voorkomende soort met bossige groeiwijze.
Asplenium trichomanes 'Incisum'	☀ ●		15	20	A	≇	Zoals de soort, maar met fijn ingesneden blaadjes.
Blechnum penna-marina	☀ ●	W	20	50	K tot M	≇	Dichte dikke wortelstokken. Glanzend rechtopstaand blad, eerst groen-rood, erna donkergroen.
Blechnum penne-marina 'Alpina'	☀ ●	W	10-15	30	K	≇	Bodembedekkende soort met kleine glanzende roodgroene tot donkergroene blaadjes. Korte, vrijwel platliggende steriele bladeren en sierlijk opgerichte fertiele sporenbladeren.
Blechnum spicant (dubbelloof) Inheems	◐ ●	W	20-60	50	K tot M	≇	Inheemse, zeldzame varen voor zeer zuur en vochtig milieu.
Cyrtonium fortunei	◐ ●	W	50	40	V		Enkelgeveerde, mat blauwgroene bladeren, meer opgerichte groeiwijze.
Cyrtonium fortunei 'Clivicola'	◐ ●	W	40	50	V		Zoals de soort, maar grover en iets overhangend. Grotere groeiwicht en frisgroen.
Dryopteris affinis 'Pinderii'	◐ ●	W	80-120	50	A		Een 'rustige' soort met opgaande groeiwijze en smalle, gewafelde bladeren.
Dryopteris bushiana	◐ ●	W	60	60	A		Een glanzend bleekgroene varen, enkel-geveerd en wintergroen. Verdraagt droogte.
Dryopteris carthusiana (smalle stekelvaren) Inheems	◐	HW	60-80	50	A tot M		Een inheemse, vrij algemene varen voor zure bodem. De smalle bladeren zijn tweemaal geveerd. Opgaande groeiwijze.
Dryopteris clintoniana	◐ ●	HW	50-70	50	K tot M		Heeft mat grijsgroene, tweemaal geveerde bladeren. Maakt vele uitlopers.
Dryopteris cycadina (olifantslurfvaren)	◐ ●	W	70-80	50	A		Een decoratieve, luchtige varen met enkelgeveerde frisgroene bladeren. Bladstelen en onderkanterven zijn bedekt met vele zwarte schubben. Dankt zijn naam met iets fantasie aan het uitkrullende blad.
Dryopteris dilatata (brede stekelvaren) Inheems	◐ ●	HW	80-120	50	A		Een algemene inheemse varen met stekelvormige bruine kafschubben op de bladsteel. Loopt lichtgroen uit en verkleurt naar donkergroen. Groeit goed op dode boomstronken en op met mos begroeide rotsen. Vraagt een koele bodem.
Dryopteris erythrosora (rode sluiervaren)	◐ ●	W	60	40	A		Loopt laat uit met oranje-bronzen bladeren die naar groen verkleuren. Grote bladeren op een lange bladsteel.



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vault, 2 - B-5646 Stave - België
 Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 E-mail: info@fougeres.be - www.fougeres.be - www.varens.be

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.
 K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.
 ≇ = géén zure bodem; ≋ = géén kalkrijke bodem.
 I = inheems.

	Stand plaats	blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Dryopteris erythrosora 'Prolifica'	◐ ●	W	40	50	A		Kleiner dan de soort met lichtgewafelde bladeren. Loopt ook rozerood uit. Vormt broedbolletjes waaruit zich nieuwe plantjes ontwikkelen.
Dryopteris sieboldii	◐	W	40	60	A	≋	Aparte, decoratieve varen met diep gedeelde, tongvormige en leerachtige bladeren. Voor beschutte plek. Wintergroen.
Dryopteris wallichiana (nepalvaren)	◐ ●	HW	100-120	60	K		Een opvallende varen met leerachtige donkergroene bladeren en zwartbehaarde bladstelen. Voor beschutte standplaats.
Phyllitis scolopendrium Inheems	◐ ●	W	40-60	30	K	≇	De inheemse tongvaren groeit in bossen met kalkrijke, rotsachtige bodem, op vochtige muren en in de duinen. Bladeren tongvormig, bladsteel kort met haarachtige schubben.
Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia'	◐ ●	W	30-60	30	K	≇	Variëteit met smalle, gekartelde bladeren.
Phyllitis scolopendrium 'Cristata'	◐ ●	W	20-40	30	K	≇	Variëteit met kortere bladeren waarvan uiteinden sterk kamvormig verbreed en ingesneden zijn.
Phyllitis scolopendrium 'Furcatum'	◐ ●	W	30	20	F	⚡	Zoals de Cristata, maar de bladeren zijn ook onderaan vertakt zoals een 'vork'.
Phyllitis scolopendrium 'Undulata'	◐ ●	W	50	30	F	⚡	Variëteit met licht gegolfde bladranden.
Polypodium vulgare Inheems	☀ ●	W	30-40	20	A		De inheemse eikvaren is een zeer sterke wintergroene varen. Ideaal als bodembedekker op oude boomstronken, oude muren en trappen, op rotsige hellingen. Houdt van zandige bodem.
Polypodium vulgare 'Bifido multifido'	☀ ●	W	30-40	20	A		Cultivar met vertakte bladstippen aan de uiteinden.
Polypodium vulgare 'Cornubiense'	☀ ●	W	30	20	A		Cultivar met zeer fijn gedeelde bladeren.
Polypodium interjectum (brede eikvaren) Inheems	◐ ●	W	20-40	20	A		Heeft bredere en meer toegespitste bladeren ; de veertjes zijn ook spitzer en gezaagd. Onderste paren vaak langer zodat de bladeren driehoekig zijn. Kalkrijke bodem.
Polystichum acrostichoïdes (kerstvaren)	◐ ●	W	50	30	A		Een wintergroene Amerikaanse varen met glanzende, eenmaal geveerde bladeren. Steriele bladeren groeien min of meer horizontaal terwijl de fertiele bladeren meer rechtop groeien. Vraagt een goed gedraineerde bodem.
Polystichum aculeatum (harde naaldvaren) Inheems	◐ ●	W	50	80	A		De inheemse, vrij zeldzame, harde naaldvaren gedijdt goed op stenige hellingen. De glanzende, leerachtige bladeren zijn tweemaal gedeeld en kunnen tot één meter lang worden. Blandranden zijn getand. Lage maar brede groeiwijze.
Polystichum andersonii	◐ ●	HW	60	40	A		Verschilt van de harde naaldvaren door de aanwezigheid van schubben op de bladsteel en de achterkant van de blaadjes. Ontwikkelt op de uiteinden van de bladeren één broedbol.
Polystichum braunii	◐	HW	50	40	AK		Loopt vroeg uit met zilverwitte schubben op de bladeren.
Polystichum munitum (zwaardvaren)	◐ ●	W	60	80	A		Vol gebladerte met korte stengel. Kunnen zeer breed worden. Stelt koele tot droge bodems op prijs die steeds goed gedraineerd zijn.
Polystichum polyblepharum (glansschildvaren)	◐ ●	W	60	80	A		Een wintergroene varen met hoogglanzende donkergroene bladeren die sierlijk overhangen. De bladsteel en onderkant van de nerven zijn bedekt met talloze bruine stroschubben.
Polystichum rigens	◐ ●	W	30	40	A		Een varen met stijve donkergroene, matglanzende, enkelgeveerde bladeren op vrij lange bladstelen. Losse groeiwijze. Beschutte standplaats.
Polystichum setiferum (zachte naaldvaren) Inheems	◐ ●	W	80	60	A		Een inheemse, sierlijke en forsgroeiende varen met zachte, matgroene en dubbelgeveerde bladeren. Zowel de bladsteel als de hoofdnerf zijn overvloedig beket met goudkleurige stroschubben, die vooral in het voorjaar deze varen zo



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vault, 2 - B-5646 Stave - België
 Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 E-mail: info@fougeres.be - www.fougeres.be - www.varens.be

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.
 K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.
 ⚡ = géén zure bodem; ⚡ = géén kalkrijke bodem.
 I = inheems.

	Stand plaats	blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
							aantrekkelijk maken. Wintergroen.
Polystichum setiferum 'Bevis'	◐●	W	80	100	A		Zeer decoratieve Engelse variëteit met glanzende donkergroene, fijn gedeelde bladeren. De veertjes zijn elegant naar boven gebogen. Een forse groeier. Steriele variëteit.
Polystichum setiferum 'Congestum' (dwergnaaldvaren)	◐●	W	20	20	A		Een lange, gedrongen groeiwijze en compacte stijf opgerichte blaadjes.
Polystichum setiferum 'Dalhem'	◐●	W	60-70	60	A		Een breedgroeïende, decoratieve en wintergroene varen. In gunstige omstandigheden kan hij uitgroeien tot een breedte van 150 cm.
Polystichum setiferum 'Divisilobum'	◐●	W	50	50	A		Een variëteit met drie- tot viermaal geveerde bladeren. De veertjes zijn smal, geoord en gesteeld. Heeft meestal een vlakke en brede groeiwijze. Produceert soms broedbolletjes op de bladsteel waaruit zich jonge plantjes ontwikkelen. Vele bruine schubben.
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	◐●	W	40	80	A		Een zeer mooie Duitse cultivar die opvalt door zijn omvang en zijn lange, twee- tot driemaal gedeelde bladeren. Vele bruine schubben sieren de bladsteel.
Polystichum setiferum 'Plumosum'	◐●	W	80	60	A		Een variëteit met een meer opgaande groeiwijze en fijn gedeelde, gepluimde bladeren.
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	◐●	W	50	50	A		Een sierlijke varen met een lage en vlakke groeiwijze.
Polystichum setiferum 'Proliferum'	◐●	W	50	50	A		Een horizontaal groeiende varen met smalle, lange en fijn gedeelde bladeren die schuin afstaan. Produceert vele broedbolletjes langs de hoofdnerf van de volwassen plant. Wintergroen.
Polystichum setiferum 'Wollastonii'	◐	W	60-70	50	A		Een varen met een gedrongen groeiwijze. Produceert af en toe broedbolletjes.
Polystichum tsus-sinense (smalle naaldvaren)	◐	W	30	30	A		Een kleine varen met dubbelgeveerde, donkergroene en driehoekige bladeren op een zwarte bladsteel. Beschutte standplaats.