



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België

GSM: 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: [info@fougeres.be](mailto:info@fougeres.be) - [www.fougeres.be](http://www.fougeres.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Droge bodem

In deze groep vinden we hoofdzakelijk varens voor schaduw en halfschaduw. Varens in volle schaduw verdragen beter droogte. Ze hebben het vermogen om het vocht uit de onmiddellijke omgeving op te nemen.

Bepaalde variëteiten zoals Cheilanthes Lanosa, Asplenium Trichomanes (steenbreekvaren) en Asplenium Ceterach (schubvaren) rollen hun blaadjes op bij droogte en zon. Bladhoudende soorten verkiezen drogere plekken dan bladverliezende variëteiten.

De volgende tabel geeft een overzicht van de soorten die een voorkeur hebben voor een droge standplaats en voor een goed doorlatende bodem.

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw. W = wintergroen ; HW = half wintergroen. K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes. ≇ = géén zure bodem; ✖ = géén kalkrijke bodem. I = inheems.							
	Standplaats	Blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Asplenium ceterach (schubvaren) Inheems	☀ ◐		10	10	A	≇	Inheemse soort in beschutte rotsspleten en op oude muren. Vooral op kalk. Past zich uitstekend aan op droge en zonnige plaatsen door zijn blaadjes op te rollen.
Asplenium trichomanes (steenbreekvaren) Inheems	☀ ●		15	20	A	≇	Inheemse, algemeen voorkomende soort met bossige groeiwijze.
Asplenium trichomanes 'Incisum'	☀ ●		15	20	A	≇	Zoals de soort, maar met fijn ingesneden blaadjes.
Cheilanthes lanosa	☀ ◐	HW	20-30	30	D		Kleine zilvergrijze rotsvaren. Zeer beschutte standplaats.
Cystopteris dickiana	◐ ●		10-15	10	A		Gedrongen uitgave van de gewone blaasvaren of Cystopteris Fragilis. Loopt al zeer vlug uit.
Dryopteris bushiana	◐ ●	W	60	60	A		Een glanzend bleekgroene varen, enkel-geveerd en wintergroen. Verdraagt droogte.
Dryopteris erythrosora (rode sluiervaren)	◐ ●	W	60	40	A		Loopt laat uit met oranje-bronzen bladeren die naar groen verkleuren. Grote bladeren op een lange bladsteel.
Dryopteris erythrosora 'Prolifica'	◐ ●	W	40	50	A		Kleiner dan de soort met lichtgewafelde bladeren. Loopt ook rozerood uit. Vormt broedbolletjes waaruit zich nieuwe plantjes ontwikkelen.
Dryopteris filix-mas (mannetjesvaren) Inheems	☀ ●		100-120	60	A		Een inheemse, algemeen voorkomende varen. Een robuuste plant, die zelfs enigszins zonnige standplaatsen verdraagt.
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	☀ ●		100-120	60	A		Krachtige groeier met smalle, opgerichte bladeren met elkaar overlappende veertjes die aan de varen een gekroesd uiterlijk geven.
Dryopteris filix-mas 'Crispa'	☀ ●		40-50	50	A		Gedrongen en gekroesde vorm met gewafelde bladeren. Vormt na jaren dichte bosjes.
Dryopteris filix-mas 'Cristata'	☀ ●		50	50	A		Nog fijner gedeeld dan de Crispa met aan de uiteinden handvormig vertakte veertjes.
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylon'	☀ ●		80-100	60	A		Opvallende, zeer smalle, lijnvormige bladeren, aan de uiteinden vertakt.
Polypodium vulgare (eikvaren) Inheems	☀ ●	W	30-40	20	A		De inheemse eikvaren is een zeer sterke wintergroene varen. Ideaal als bodembedekker op oude boomstronken, oude muren en trappen, op rotsige hellingen. Houdt van zandige bodem.
Polypodium vulgare 'Bifido multifido'	☀ ●	W	30-40	20	A		Cultivar met vertakte bladstippen aan de uiteinden.
Polypodium vulgare 'Cornubiense'	☀ ●	W	30	20	A		Cultivar met zeer fijn gedeelde bladeren.
Polypodium interjectum (brede eikvaren) Inheems	◐ ●	W	20-40	20	A		Heeft bredere en meer toegespitste bladeren ; de veertjes zijn ook spitzer en gezaagd. Onderste paren vaak langer zodat de bladeren driehoekig zijn. Kalkrijke bodem.



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België  
 Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 E-mail: [info@fougeres.be](mailto:info@fougeres.be) - [www.fougeres.be](http://www.fougeres.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.  
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.  
 K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.  
 ⚡ = géén zure bodem; ⚡ = géén kalkrijke bodem.  
 I = inheems.

	Stand plaats	blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Polystichum acrostichoïdes (kerstvaren)	◐ ●	W	50	30	A		Een wintergroene Amerikaanse varen met glanzende, eenmaal geveerde bladeren. Steriele bladeren groeien min of meer horizontaal terwijl de fertiele bladeren meer rechtop groeien. Vraagt een goed gedraineerde bodem.
Polystichum aculeatum (harde naaldvaren) Inheems	◐ ●	W	50	80	A		De inheemse, vrij zeldzame, harde naaldvaren gedijt goed op stenige hellingen. De glanzende, leerachtige bladeren zijn tweemaal gedeeld en kunnen tot één meter lang worden. Blandranden zijn getand. Lage maar brede groeiwijze.
Polystichum munitum (zwaardvaren)	◐ ●	W	60	80	A		Vol gebladerte met korte stengel. Kunnen zeer breed worden. Stelt koele tot droge bodems op prijs die steeds goed gedraineerd zijn.
Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Inheems	☀ ◐		100-150	200	A		De inheemse adelaarsvaren is een kosmopoliet en wordt gekenmerkt door lange, kruipende wortelstokken. De bladeren ontwikkelen zich afzonderlijk op de wortelstok. Ze kunnen een hoogte bereiken van 180 cm en zijn dubbel- tot drievoudig geveerd. Kalkmijdende soort in bossen op voedselarme zand- en leemgrond. Verkleuren mooi in het najaar.
Woodsia obtusa	◐ ●		30	10	A		Een rotsvaren met 30 cm lange lancetvormige, lichtgroene bladeren op gele bladsteel. Opgaande groeiwijze.