



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België

GSM 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: [info@fougeres.be](mailto:info@fougeres.be) - [www.fougeres.be](http://www.fougeres.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Varens van 80 tot 120 cm

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw. W = wintergroen ; HW = half wintergroen. K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes. ⚡ = géén zure bodem; ⚡ = géén kalkrijke bodem. I = inheems.							
	Standplaats	Blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Athyrium filix-femina (wijfjesvaren) Inheems	☀●		100-120	60	A		Sterke varen met lange, heldergroene bladeren die fijn geveerd zijn. Indien de bodem voldoende vochtig is, verdragen ze meer zon. Verkleurt mooi geel in het najaar.
Athyrium filix-femina 'Cristatum'	☀●		60-80	30	A		Kleiner dan de soort, met vertakte, gevorkte blaadjes.
Athyrium filix-femina 'Rotstiel' Inheems	☀●		100-120	60			Duitse variëteit met opvallend roodbruine bladsteel en lichte, geelgroene bladeren.
Athyrium vidalii	◐●		80	50	K		Decoratieve, fors groeiende soort die roodpaars uitloopt en verkleurt naar donkergroen. Zeer lange bladstelen.
Dryopteris affinis (goudschubvaren) Inheems	◐●	HW	80-120	60	A		Forse, glanzende, enkelgeveerde bladeren. Bladsteel sterk bezet met aanvankelijk goudkleurige en later kastanjebruine kafschubben.
Dryopteris affinis 'Cristata the king'	◐●	HW	80	60	A		Mooie vorm waarvan de uiteinden van de bladeren handvormig vertakt zijn.
Dryopteris affinis 'Pinderii'	◐●	W	80-120	50	A		Een 'rustige' soort met opgaande groeiwijze en smalle, gewafelde bladeren.
Dryopteris carthusiana (smalle stekelvaren) Inheems	◐	HW	60-80	50	A tot M		Een inheemse, vrij algemene varen voor zure bodem. De smalle bladeren zijn tweemaal geveerd. Opgaande groeiwijze.
Dryopteris cycadina (olifantslurfvaren)	◐●	W	70-80	50	A		Een decoratieve, luchtige varen met enkelgeveerde frisgroene bladeren. Bladstelen en onderkantnerven zijn bedekt met vele zwarte schubben. Dankt zijn naam met iets fantasie aan het uitkrullende blad.
Dryopteris dilatata (brede stekelvaren) Inheems	◐●	HW	80-120	50	A		Een algemene inheemse varen met stekelvormige bruine kafschubben op de bladsteel. Loopt lichtgroen uit en verkleurt naar donkergroen. Groeit goed op dode boomstronken en op met mos begroeide rotsen. Vraagt een koele bodem.
Dryopteris filix-mas (mannetjesvaren) Inheems	☀●		100-120	60	A		Een inheemse, algemeen voorkomende varen. Een robuuste plant, die zelfs enigszins zonnige standplaatsen verdraagt.
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	☀●		100-120	60	A		Krachtige groeier met smalle, opgerichte bladeren met elkaar overlappende veertjes die aan de varen een gekroesd uiterlijk geven.
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylon'	☀●		80-100	60	A		Opvallende, zeer smalle, lijnvormige bladeren, aan de uiteinden vertakt.
Dryopteris goldiana	◐●		120-150	60	A		Amerikaanse 'reuzebosvaren' met grote fris geelgroene bladeren aan een lange bladsteel. Windgevoelig.
Dryopteris stewartii	◐		80	70	V		Varen met grote driehoekige bladeren, twee- tot driemaal gedeeld. Veertjes scherp getand en uiteinden zeer spits toelopend.
Dryopteris tokoyensis	◐●		100-120	40	A		Japanse varen met smalle, opgerichte, frisgroene bladeren op een zwarte bladsteel. Windgevoelig.
Dryopteris wallichiana (nepalvaren)	◐●	HW	100-120	60	K		Een opvallende varen met leerachtige donkergroene bladeren en zwartbehaarde bladstelen. Voor beschutte standplaats.
Matteuccia pensylvanica (Amerikaanse struisvaren)	◐●		120-150	50	A tot M		Een grotere cultivar met meer opgerichte langere bekers.
Matteuccia struthiopteris Inheems	◐		100-120	↔	A tot M		Een mooie varen voor vochthoudende humusrijke grond. De korte rechtopstaande fertiele bladeren verschijnen in de loop van de zomer en blijven de hele winter mooi. Vormt vele uitlopers en bedekt op termijn grote vlakken.



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vault, 2 - B-5646 Stave - België  
 Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 E-mail: [info@fougeres.be](mailto:info@fougeres.be) - [www.fougeres.be](http://www.fougeres.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.  
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.  
 K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.  
 ⚡ = géén zure bodem; ⚡ = géén kalkrijke bodem.  
 I = inheems.

	Stand plaats	blad	H (cm)	B (cm)	Bodem	pH	Omschrijving
Osmunda cinnamomea (kaneelvaren)	◐ ●		100	60	K tot M		Heeft kaneelkleurige smalle opgaande sporenpluimen. Samen met de zachtgroene, steriele bladeren is het een prachtig gezicht!
Osmunda claytoniana (kroonvaren)	◐		80	100	K tot M		De fertiele bladeren met in het midden de sporendoesjes, in plaats van op de top, zoals de koningsvaren, ontwikkelen zich eerder dan de steriele bladeren. Kleurt in het najaar mooi geelbruin. Voor vochtige plaatsen.
Osmunda regalis Inheems	☀ ◐		100-200	150	K tot M	⚡	Deze inheemse, zeldzame varen kan op zeer gunstige standplaatsen een hoogte van 2 meter bereiken. De dubbelgeveerde steriele bladeren staan op lange bladstelen. De top van de fertiele bladeren zijn dicht bezet met sporendoesjes die aanvankelijk groen en later roestbruin van kleur zijn. Ze gelijken wel op bloeiende aren! Schitterende verkleuring in de herfst.
Osmunda regalis 'Purpurescens' Inheems	☀ ◐		100-200	150	V	⚡	Heeft paarse bladsteel en bladnervatuur en loopt ook roodachtig uit.
Polystichum setiferum (zachte naaldvaren) Inheems	◐ ●	W	80	60	A		Een inheemse, sierlijke en forsgroeiende varen met zachte, matgroene en dubbelgeveerde bladeren. Zowel de bladsteel als de hoofdnerf zijn overvloedig beket met goudkleurige stroschubben, die vooral in het voorjaar deze varen zo aantrekkelijk maken. Wintergroen.
Polystichum setiferum 'Bevis'	◐ ●	W	80	100	A		Zeer decoratieve Engelse variëteit met glanzende donkergroene, fijn gedeelde bladeren. De veertjes zijn elegant naar boven gebogen. Een forse groeier. Steriele variëteit.
Polystichum setiferum 'Plumosum'	◐ ●	W	80	60	A		Een variëteit met een meer opgaande groeiwijze en fijn gedeelde, gepluimde bladeren.
Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) Inheems	☀ ◐		100-150	200	A		De inheemse adelaarsvaren is een kosmopoliet en wordt gekenmerkt door lange, kruipende wortelstokken. De bladeren ontwikkelen zich afzonderlijk op de wortelstok. Ze kunnen een hoogte bereiken van 180 cm en zijn dubbel- tot drievoudig geveerd. Kalkmijdende soort in bossen op voedselarme zand- en leemgrond. Verkleuren mooi in het najaar.
Thelypteris palustris (moerasvaren) Inheems	☀ ◐		30-80	100	M		De inheemse moerasvaren komt algemeen voor in moerassen en vochtige bossen. Heeft vrij lichtgroene, tweemaal geveerde bladeren en is fijn van structuur. De fertiele bladeren zijn dikker en langer dan de steriele bladeren en verschijnen in de vroege zomer. Heeft een kruipende wortelstok.
Woodwardia fimbriata	◐		100-120	50	F à M		Noord-Amerikaanse varen met grote groeikracht. Grote, leerachtige bladeren op korte bladsteel. Eerst bruinrood, later donkergroen. Produceert kettingvormende sporen op de achterkant van de bladeren. Mooi langs vijvers en beekjes voor vochtige, enigszins zure bodem. Zéér beschutte standplaats.